

Листок-вкладыш – информация для пациента**Девясил с витамином С, сироп**

Действующие вещества: экстракт корневищ и корней девясила жидкий водный (1:10) и аскорбиновая кислота.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Девясил с витамином С, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Девясил с витамином С.
3. Прием препарата Девясил с витамином С.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Девясил с витамином С.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Девясил с витамином С, и для чего его применяют

Препарат Девясил с витамином С, относящийся к группе отхаркивающие средства, содержит действующие вещества экстракт корневищ и корней девясила жидкий водный и аскорбиновую кислоту.

Препарат Девясил с витамином С применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение своего состояния, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Девясил с витамином С

Не принимайте препарат Девясил с витамином С:

- если у вас повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата (см. раздел. 6);
- если у вас повышенная чувствительность к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, ромашка, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема;
- сахарный диабет и состояния, сопровождающиеся повышенным содержанием сахара в крови;
- повышенная свертываемость крови;
- склонность к тромбозам;
- тромбофлебит (воспаление стенки венозных сосудов с образованием тромбов);
- тяжелые заболевания почек;
- беременность и период лактации.

Не давайте препарат Девясил с витамином С детям в возрасте до 12 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу перед приемом препарата Девясил с витамином С.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед приемом препарата Девясил с витамином С проконсультируйтесь с лечащим врачом и сообщите ему следующую информацию:

- если у вас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (генетический дефект фермента, участвующего в метаболизме эритроцитов);
- если вы принимаете препараты, содержащие аскорбиновую кислоту;
- если у вас выявлено повышенное содержание железа в организме;
- если у вас выявлены быстро прогрессирующие и интенсивно метастазирующие злокачественные новообразования, так как прием препарата Девясил с витамином С может усугубить течение процесса;
- если у вас выявлено любое из следующих заболеваний:
 - мочекаменная болезнь;
 - гемохроматоз (генетическое заболевание, проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в тканях и органах);
 - сидеробластная анемия (анемия, характеризующаяся снижением содержания гемоглобина в эритроцитах, высоким уровнем сывороточного железа с его избыточным отложением в тканях);
 - талассемия (генетическое заболевание, сопровождающееся образованием недостаточного количества гемоглобина);
 - гипероксалурия (повышенное выведение оксалатов с мочой);
- если у вас непереносимость некоторых сахаров;
- если при приеме лекарственного препарата Девясил с витамином С симптомы заболевания сохраняются более 1 недели или возникает одышка, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой.

При приеме препарата возможно искажение результатов лабораторных тестов на определение в крови глюкозы, билирубина, активности печеночных трансаминаз и лактатдегидрогеназы (ЛДГ).

Другие препараты и препарат Девясил с витамином С

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите своему лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете:

- антибактериальные препараты (сульфаниламиды, пенициллины, тетрациклины и другие);
- препараты железа;
- дефероксамин (лекарственный препарат, связывающий железо и алюминий);
- ацетилсалициловую кислоту (лекарственный препарат, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие);
- пероральные контрацептивы;
- изопреналин (бронхолитический препарат);
- барбитураты и примидон (лекарственный препарат, применяемый при эпилепсии);
- антипсихотические препараты;
- антидепрессанты и амфетамин (препарат, оказывающий психостимулирующее действие);
- противокашлевые препараты и препараты, уменьшающие образование мокроты.

Препарат Девясил с витамином С с напитками и алкоголем

Свежие соки и щелочное питье (минеральные воды) снижают всасывание и усвоение аскорбиновой кислоты.

Необходимо избегать употребления алкоголя и других лекарственных препаратов, содержащих этанол.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения экстракта корневищ и корней девясила во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать лекарственный препарат Девясил с витамином С во время беременности и лактации противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования влияния препарата Девясил с витамином С на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились.

3. Прием препарата Девясил с витамином С


Всегда принимайте препарат Девясил с витамином С в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования

Взрослые

По 10 мл сиропа (2 ложки дозирующие) 3 раза в сутки.

Применение у детей и подростков



- От 12 лет: по 10 мл сиропа (2 ложки дозирующие) 2 раза в сутки.

Путь и (или) способ введения

Препарат Девясил с витамином С предназначен для приема внутрь.

Принимать за полчаса до еды.

Перед употреблением взбалтывать.

Для дозирования сиропа используйте входящую в состав упаковки ложку дозирующую 5 мл.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Если вы приняли препарата Девясил с витамином С больше, чем следовало

Симптомы передозировки при применении более 1000 мг аскорбиновой кислоты (более 250 мл препарата Девясил с витамином С) – головная боль, повышение возбудимости центральной нервной системы, бессонница, тошнота, рвота, диарея, гиперацидный гастрит (гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока), изъязвление слизистой оболочки ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (повышение уровня глюкозы в крови, наличие глюкозы в моче), высокая концентрация оксалата в моче, наличие в мочевыводящих путях мочевого конкремента, повреждение гломерулярного аппарата почек, учащенное мочеиспускание (может возникнуть при приеме дозы аскорбиновой кислоты более 600 мг в сутки – 150 мл препарата Девясил с витамином С), снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей, повышение артериального давления, склонность к тромбозам, поражение мелких кровеносных сосудов). Возможны изменения лабораторных показателей: тромбоцитоз (увеличение количества тромбоцитов в крови), гиперпротромбинемия (повышенное содержание в крови протромбина), эритропения (пониженное количество эритроцитов в крови), нейтрофильный лейкоцитоз (увеличение количества нейтрофилов), гипокалиемия (снижение концентрации калия).

Передозировка экстрактом корневищ и корней девясила приводит к развитию рвоты, диареи, болей спастического характера и симптомов паралича кишечника.

Если у вас возникли подобные симптомы или вы подозреваете передозировку препаратом, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если вы забыли принять препарат Девясил с витамином С

При пропуске одной или нескольких доз прием препарата следует возобновить в обычном режиме, не удваивая дозы.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Девясил с витамином С может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- кожная сыпь;
- гиперемия кожи (покраснение кожи, связанное с увеличением притока крови);
- крапивница;
- отек Квинке (ангионевротический отек);
- анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция);
- угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (повышение уровня глюкозы в крови, наличие глюкозы в моче);
- нарушение обмена цинка и меди;
- при длительном применении больших доз (более 1000 мг аскорбиновой кислоты) – головная боль, повышение возбудимости центральной нервной системы, нарушение сна (бессонница);
- при применении в высоких дозах – дистрофия миокарда (нарушение функции сердечной мышцы);
- при применении в больших дозах – ухудшение трофики тканей, повышение артериального давления, развитие микроангиопатий (атеросклеротическое поражение мелких кровеносных сосудов), тромбоз.
- раздражение слизистой ЖКТ;
- при длительном применении больших доз – тошнота, рвота, диарея, гиперацидный гастрит (гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока), изъязвление слизистой ЖКТ;
- учащенное мочеиспускание (при приеме аскорбиновой кислоты более 600 мг в сутки);
- при длительном применении в больших дозах – гипероксалурия (повышенное выведение оксалата с мочой), образование мочевых камней и кальция оксалата, повреждение гломерулярного аппарата почек;
- тромбоцитоз (повышенное количество тромбоцитов в крови);
- гиперпротромбинемия (повышенное количество протромбина в крови);
- эритропения (пониженное количество эритроцитов в крови);
- нейтрофильный лейкоцитоз (увеличение содержания нейтрофилов);
- гипокалиемия (снижение концентрации калия в сыворотке крови);
- гемолиз эритроцитов (может развиваться у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).

Если вы заметили у себя появление каких-либо нежелательных реакций, в том числе не указанных в этом листке-вкладыше, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете

сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский 2а,

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс отдела фармаконадзора: +375(17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Девясил с витамином С

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после слов «годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °С.

Использовать в течение 10 суток после вскрытия бутылки.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Девясил с витамином С содержит

Действующими веществами являются экстракт корневищ и корней девясила жидкий водный (110:) и аскорбиновая кислота.

В 200 мл сиропа содержится 93,06 г экстракта корневищ и корней девясила жидкого водного (110:) и 0,77 г аскорбиновой кислоты.

Вспомогательными веществами являются:

сорбитол (Е420);

калия сорбат (Е202);

вода очищенная.


Внешний вид препарата Девясил с витамином С и содержимое упаковки

Сироп. Густая, однородная, непрозрачная жидкость, светло-коричневого цвета с характерным для растительного экстракта корневищ и корней девясила запахом. Допускается в процессе хранения образование осадка.

По 200 мл сиропа в бутылках из полиэтилентерефталата с колпачками полимерными винтовыми с предохранительным кольцом. На бутылку наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Каждую бутылку вместе с листком-вкладышем и ложкой дозирующей 5 мл помещают в пачку картонную.

Условия отпуска: без рецепта врача.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Открытое акционерное общество «Экзон»

Республика Беларусь, 225612, Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 202

тел./факс: +375 1644 2 00 02, 2 00 03

адрес электронной почты: bm@ekzon.by

Листок-вкладыш пересмотрен

