

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для пациента

Уголь активированный-УБФ, 250 мг, таблетки

Действующее вещество: активированный уголь

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Уголь активированный-УБФ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Уголь активированный-УБФ.
3. Прием препарата Уголь активированный-УБФ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Уголь активированный-УБФ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Уголь активированный-УБФ, и для чего его применяют

Препарат Уголь активированный-УБФ содержит действующее (активное) вещество активированный уголь. Активированный уголь относится к группе кишечных адсорбентов, обладает высокой сорбционной (поглощающей) способностью, уменьшает всасывание из пищеварительного тракта токсических веществ, солей тяжелых металлов, алкалоидов и гликозидов, лекарственных веществ, способствуя их выведению из организма.

Препарат Уголь активированный-УБФ применяется при:

- комплексном лечении пищевых токсикоинфекций;
- острых отравлениях бытовыми, промышленными и пищевыми ядами, алкалоидами, лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов;

1674 Б-2017

- диспепсии (нарушение пищеварения, сопровождающееся тяжестью и болями в верхней части живота) и метеоризме (повышенное газообразование);
- ультразвуковом и рентгеновском обследовании для уменьшения газообразования.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение своего состояния, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Уголь активированный-УБФ

Не принимайте препарат Уголь активированный-УБФ:

- если у вас повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата (см. раздел. 6);
- язвенные поражения пищеварительного тракта;
- желудочные кровотечения;
- атония кишечника (нарушение моторной функции кишечника).

Не давайте Уголь активированный-УБФ детям в возрасте до 3-х лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу перед приемом препарата Уголь активированный-УБФ.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед приемом препарата Уголь активированный-УБФ проконсультируйтесь с лечащим врачом и сообщите ему следующую информацию:

- если вы предполагаете, что отравление могло быть вызвано препаратами, содержащими следующие вещества:
 - сердечные гликозиды (препараты, применяемые для лечения сердечной недостаточности);
 - индометацин (препарат, обладающий противовоспалительным, обезболивающим и противоотечным действием);
 - морфин и другие опиаты (препараты, обладающие сильным обезболивающим действием).
- если отравление могло быть вызвано кислотами или щелочами. Препарат Уголь активированный-УБФ не показан к применению при отравлении данными веществами.

При приеме препарата Уголь активированный-УБФ необходимо учитывать:

- при лечении сопутствующих заболеваний препарат Уголь активированный-УБФ принимают за 1-2 часа до или через такое же время после приема других лекарственных препаратов (снижает эффективность других препаратов при одновременном приеме);
- если вы недавно принимали пищу, то необходимо будет увеличить дозу активированного угля, так как содержимое пищеварительного тракта может адсорбироваться углем, вследствие чего эффективность лекарственного препарата снижается;
- препарат Уголь активированный-УБФ окрашивает каловые массы в черный цвет.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- лицам пожилого возраста и детям активированный уголь рекомендуется принимать вместе с раствором электролитов с глюкозой;
- рекомендуется хранить препарат в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную (поглощающую) способность.

Другие препараты и препарат Уголь активированный-УБФ

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не принимайте другие лекарственные препараты вместе с препаратом Уголь активированный-УБФ в связи с его выраженными адсорбирующими свойствами. Следует принимать другие препараты за некоторое время до или после приема препарата Уголь активированный-УБФ.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Данные о применении активированного угля у беременных женщин и кормящих матерей отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Уголь активированный-УБФ не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Прием препарата Уголь активированный-УБФ

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования

Взрослые

Обычная доза: по 3-6 таблеток 3-4 раза в сутки.

Максимальная разовая доза составляет 8 г, что соответствует 32 таблеткам.

Применение у детей и подростков


Обычная доза: 2-4 таблетки 3-4 раза в сутки.

При диарее дозу увеличивают до 4-5 таблеток 3-4 раза в сутки.

При различного рода отравлениях:

- От 3 до 7 лет: 20 таблеток (5 г) 3 раза в сутки.
- От 7 до 14 лет: 28 таблеток (7 г) 3 раза в сутки.

При диспепсии и метеоризме: 4-8 таблеток (1-2 г) 3-4 раза в сутки.



Острое отравление

При острых отравлениях лечение необходимо начинать с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем принимают в дозе 20-30 г (80-120 таблеток) на прием в виде водной взвеси в 0,5-2 стаканах воды.

Путь и (или) способ введения

Препарат Уголь активированный-УБФ предназначен для приема внутрь.

Для взрослых: в таблетках или после предварительного измельчения необходимого количества таблеток с последующим размешиванием в половине стакана воды. Принимать за 1-2 ч до или после еды и/или после приема других лекарственных препаратов.

Для детей: в виде взвеси измельченных таблеток в небольшом количестве воды, после приема которой необходимо выпить стакан воды. Принимать за 1-2 ч до или после еды и/или после приема других лекарственных препаратов.

Продолжительность терапии

При острых заболеваниях продолжительность лечения составляет 3-5 дней.

При хронических заболеваниях, вызванных эндогенными интоксикациями, – 10-15 дней.

При диспепсии, метеоризме – 3-7 дней.

При необходимости, по рекомендации врача, возможен повторный курс через 2 недели.

Если вы приняли препарата Уголь активированный-УБФ больше, чем следовало

До настоящего времени не было сообщений о реакциях, связанных с передозировкой, или симптомах интоксикации при использовании препарата Уголь активированный-УБФ.

В случае передозировки возможны проявления диспепсии, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если вы забыли принять препарат Уголь активированный-УБФ

При пропуске одной или нескольких доз прием препарата следует возобновить в обычном режиме, не удваивая дозы.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.


4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Уголь активированный-УБФ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- запор;
- диарея;



- диспепсия;
- окрашивание каловых масс в черный цвет;
- нарушение всасывания из желудочно-кишечного тракта питательных веществ, кальция, витаминов (при применении более 14 дней);
- гиповитаминоз (при применении более 14 дней).

Если вы заметили у себя появление каких-либо нежелательных реакций, в том числе не указанных в этом листке-вкладыше, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский 2а,

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс отдела фармаконадзора: +375(17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Уголь активированный-УБФ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка) для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.

Не принимайте препарат, если вы заметили повреждение контурной ячейковой упаковки.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Уголь активированный-УБФ содержит

Действующим веществом является активированный уголь.

Каждая таблетка содержит 250 мг активированного угля.

Вспомогательные вещества:

крахмал картофельный.



Внешний вид препарата Уголь активированный-УБФ и содержимое упаковки

Таблетки. Черного цвета, слегка шероховатые, круглые плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной с термосвариваемым покрытием.

По 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем (инструкцией по медицинскому применению) в пачке картонной.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Открытое акционерное общество «Экзон»

Республика Беларусь, 225612, Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 202

тел./факс: +375 1644 2 00 02, 2 00 03

адрес электронной почты: bm@ekzon.by

Листок-вкладыш пересмотрен

