

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Гербион® сироп плюща

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с данным листком-вкладышем или с назначением врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Обратитесь к работнику аптеки, если вам необходима дополнительная информация или рекомендация.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Вы должны обратиться к врачу, если через 7 дней лечения не почувствовали улучшение или стали чувствовать себя хуже.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

1. Что из себя представляет препарат Гербион® сироп плюща, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Гербион® сироп плюща
3. Применение препарата Гербион® сироп плюща
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Гербион® сироп плюща
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГЕРБИОН® СИРОП ПЛЮЩА, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Гербион® сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, основными компонентами которого являются тритерпеновые сапонины.

Гербион® сироп плюща – лекарственное средство растительного происхождения, которое применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® СИРОП ПЛЮЩА

Не принимайте Гербион® сироп плюща:

- если у вас повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также растениям семейства аралиевых (Araliaceae).

Не рекомендуется прием лекарственного средства детям до 2 лет в связи с риском ухудшения респираторных симптомов из-за увеличения количества мокроты.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем принимать Гербион® сироп плюща.

- если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление

мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

- если через 7 дней лечения вы не почувствовали улучшение, обратитесь к лечащему врачу.

- при совместном применении с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или декстрометорфан, не рекомендовано без предварительной консультации с врачом.

- вам следует соблюдать осторожность, если у вас гастрит или язвенная болезнь желудка.

- если у вас нарушения в функции почек или печени, пожалуйста, поговорите со своим врачом или работником аптеки относительно корректировки дозы, прежде чем принимать Гербион® сироп плюща.

Применение у детей

В случае длительного или возникающего повторно кашля у ребенка в возрасте 2-4 лет перед началом лечения необходима консультация врача для уточнения диагноза.

Другие препараты и Гербион® сироп плюща

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами

Гербион® сироп плюща с пищей и напитками

Вы можете применять Гербион® сироп плюща независимо от приема пищи.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Гербион® сироп плюща.

В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

О влиянии Гербион® сироп плюща на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не сообщалось.

Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420) и этанол

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать данный препарат.

В препарате содержится небольшое количество этанола (спирта) - менее чем 100 мг на дозу 5 мл сиропа.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® СИРОП ПЛЮЩА

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями врача или фармацевта. Если вы не уверены, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

Рекомендуемая доза для **взрослых и детей старше 12 лет** - 5-7,5 мл сиропа (1-1,5 мерной ложки) два раза в день (соответствует 70 - 105 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Применение у детей

Рекомендуемая доза для **детей от 6 до 12 лет** - 5 мл сиропа (1 мерная ложка) два раза в день (соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Рекомендуемая доза для **детей от 2 до 5 лет** - 2,5 мл сиропа (0,5 мерной ложки) два раза в день (соответствует 35 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Препарат противопоказан детям младше 2 лет.

Гербион® сироп плюща принимается вне зависимости от приема пищи, следует избегать приема препарата в вечернее время и непосредственно перед сном. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой жидкости.

Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема сиропа, то следует проконсультироваться с врачом. Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Если вы приняли препарата Гербион® сироп плюща больше, чем следовало

Не принимайте дозы, превышающие рекомендованные.

Если Вы приняли дозу, превышающую суточную дозу более чем в два раза, возможны тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли принять препарат Гербион® сироп плюща

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным средствам препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщалось о следующих нежелательных реакциях, для которых частота неизвестна (частота не может быть определена на основании имеющихся данных):

- тошнота, рвота, диарея.
- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожной сыпи и затруднения дыхания.
- тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции), которые может проявляться в виде отеков рта, языка, лица и/или горла, затрудненного дыхания или глотания (хрипы из-за стеснения в груди).

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. При возникновении тяжелых аллергических реакций, следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные

нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® СИРОП ПЛОЩА

Не требует особых условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.

3 года.

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 мл сиропа содержит 7 мг сухого экстракта листьев плюща (5 – 7,5 : 1).

Растворитель для экстракции: этанол 30% (м/м)

Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизованный) (E420), глицерин (E422), натрия бензоат (E211), лимонная кислота моногидрат (E330), ароматизатор с запахом мяты (состоит из пропиленгликоля (E1520), этанола, масла цитронеллы, цитраля ex. Litsea cubeba, масла лимона и масла кориандра), вода очищенная.

См. раздел «Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420) и этанол».

Внешний вид препарата Гербион® сироп плюща и содержимое упаковки

Сироп желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом.
Допускается наличие осадка.

150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой, мерной ложкой и листком-вкладышем в картонной коробке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель

КРКА д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения