

НД РБ

0267 Б-2016



Листок-вкладыш – информация для пациента

**Фурацилин, 2 мг/г, мазь для наружного применения**

Действующее вещество: нитрофурал (нитрофуразон)

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин.
3. Применение препарата Фурацилин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фурацилин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### **1. Что из себя представляет препарат Фурацилин и для чего его применяют**

Препарат Фурацилин содержит действующее вещество нитрофурал, обладающее антимикробным действием и относится к фармакотерапевтической группе «Антисептики и дезинфицирующие препараты. Производные нитрофурана».

Препарат Фурацилин применяется в лечении гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени, обморожения II-III степени, мелких повреждений кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, Вам необходимо обратиться к врачу.

### **2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин**

#### **Не применяйте препарат Фурацилин:**

- если у Вас аллергия к нитрофуралу, другим производным нитрофурана или любым другим компонентам этого препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы страдаете аллергическими дерматозами;
- если у Вас наблюдается кровотечение из раны.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Фурацилин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у беременных (см. раздел 2 «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Если у Вас остались вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

### **Дети и подростки**

Безопасность и эффективность препарата Фурацилин у детей не установлены. Данные отсутствуют. Не рекомендуется применять препарат Фурацилин у младенцев и детей раннего возраста.

### **Другие препараты и препарат Фурацилин**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения в период беременности и грудного вскармливания не установлена. Если Вы беременны или кормите грудью, Вам не рекомендуется применять препарат Фурацилин.

Лекарственный препарат может быть назначен только врачом.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат Фурацилин не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## **3. Применение препарата Фурацилин**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

Для лечения ожогов и обморожений II-III степени, поверхностных ран кожи мазь наносят тонким слоем 1-3 раза в сутки.

Необходимо учитывать официальные рекомендации по назначению и использованию антибактериальных препаратов. При появлении вопросов или сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Детям и подросткам лекарственный препарат может быть назначен только врачом.

### **Способ применения**

Препарат Фурацилин предназначен для наружного применения.

Возможно применение под марлевые повязки.

### **Продолжительность терапии**

Рекомендуемая продолжительность лечения составляет 2-3 дня.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, посоветуйтесь с Вашим врачом.

### **Если Вам применили препарата Фурацилин больше, чем следовало**

Не было выявлено случаев передозировки препаратом Фурацилин.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Фурацилин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Фурацилин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного или нескольких из следующих признаков аллергической реакции или дерматита в месте нанесения препарата: покраснение кожи, появление сыпи или волдырей, зуд, отёк кожи.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: <https://www.rceth.by>

#### 5. Хранение препарата Фурацилин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

##### Препарат Фурацилин содержит

Действующее вещество: нитрофурал (нитрофуразон).

1 г мази для наружного применения содержит 2 мг нитрофурала (нитрофуразона).

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый.

##### Внешний вид препарата Фурацилин и содержимое его упаковки

Мазь для наружного применения.

Мазь желтого цвета.

НД РБ

0267 Б-2016

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Первичная упаковка: по 25 г в тубах алюминиевых с бушонами из полимерного материала.

Вторичная упаковка: каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

**Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

Минская обл., 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

тел/факс +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

E-mail: market@borimed.com

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).