

3 г, гранулы для приготовления раствора внутрь

Действующее вещество: L-орнитин-L-аспартат

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

#### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Гепта-Мерц, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Гепта-Мерц.
3. Прием препарата Гепта-Мерц.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гепта-Мерц.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

#### **1. Что из себя представляет препарат Гепта-Мерц, и для чего его применяют**

##### **Показания к применению**

Гепта-Мерц используется для лечения заболеваний и осложнений, связанных с нарушением детоксикационной функции печени (например: цирроз печени) с симптомами латентной и манифестной печеночной энцефалопатии.

#### **2. О чем следует знать перед приемом препарата Гепта-Мерц**

##### **Противопоказания**

Не применяйте лекарственный препарат, если у Вас:

- аллергия на L-орнитин-L-аспартат или любые другие компоненты препарата, (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- выраженная почечная недостаточность (при показателе креатинина более 3,0 мг/100 мл).

##### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.


##### *Пациенты пожилого возраста*

Ограничений по применению препарата у пожилых людей не установлено.

##### *Дети*

Лекарственный препарат не применяют у детей в связи с отсутствием данных.

##### **Другие препараты и препарат Гепта-Мерц**



Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете или недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. На данный момент о каких-либо взаимодействиях ничего не известно.

### **Препарат Гепат-Мерц с напитками**

Препарат Гепат-Мерц — это гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, которые следует растворить в большом количестве жидкости (например, в стакане воды, чая или сока) и принимать во время или после еды.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Беременность

Безопасность применения лекарственного препарата Гепат-Мерц во время беременности не установлена. Поэтому, если Вы беременны, Вам следует принимать данный препарат только по назначению врача.

#### Грудное вскармливание

Неизвестно, проникает ли активное действующее вещество, содержащееся в препарате Гепат-Мерц, в грудное молоко. Поэтому, если Вы кормите грудью, Вам следует принимать данный препарат только по назначению врача.

#### Фертильность

Данных о влиянии Гепат-Мерц на фертильность нет.

Прежде чем принимать какие-либо препараты, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Во время лечения препаратом Гепат-Мерц способность управлять автомобилем и механизмами может быть нарушена вследствие основного заболевания.

### **Препарат Гепат-Мерц содержит:**

- **фруктозу:** если у Вас сахарный диабет или непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. Гепат-Мерц содержит в одном пакетике 1,13 г фруктозы (что эквивалентно 0,11 ХЕ). Гепат-Мерц при длительном использовании может нанести вред зубам (вызвать кариес).
- **краситель оранжевый желтый (Е110):** может вызывать аллергические реакции.

## **3. Прием препарата Гепат-Мерц**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

1-2 пакетика гранул, растворенных в 200 мл жидкости, принимайте 2-3 раза в сутки.

### **Способ применения**


Препарат Гепат-Мерц — это гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, которые следует растворить в большом количестве жидкости (например, в стакане воды, чая или сока) и принимать во время или после еды. Готовый к применению раствор следует использовать сразу после приготовления.

#### *Применение у детей и подростков*

Лекарственный препарат не применяют у детей в связи с отсутствием данных.

*Если вы приняли препарата Гепат-Мерц больше, чем следовало*

5.197 - 2020



До настоящего времени не наблюдалось никаких признаков интоксикации после передозировки препаратом Гепат-Мерц. При необходимости врач устранил симптомы.

***Если вы забыли принять препарат Гепат-Мерц***

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Просто примите следующую дозу в нужное время, как указано в инструкции по дозировке. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь к врачу.

***Если вы прекратили прием препарата Гепат-Мерц***

При наличии вопросов по применению препарата Гепат-Мерц обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Гепат-Мерц может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- поражение роговицы, отек роговицы, снижение остроты зрения.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- боль в конечностях.

Данные нежелательные реакции обычно являются проходящими и не требуют отмены препарата.

Краситель оранжевый желтый (Е 110) может вызывать аллергические реакции.

Нежелательные реакции классифицируются в соответствии со следующими данными о частоте возникновения:

очень часто – могут возникать более чем у 1 человека из 10;

часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10;

нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100;

редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000;

очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000;

частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242 00 29

Факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

#### **5. Хранение препарата Гепат-Мерц**

Храните лекарственный препарат Гепат-Мерц при температуре не выше 25 °С.

Храните в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как правильно утилизировать препарат, который вы больше не используете. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения**

Каждый пакетик (5 г гранул) содержит 3 г L-орнитин-L-аспартата.

##### **Препарат Гепе-Мерц содержит**

Действующим веществом является L-орнитин-L-аспартат.

Вспомогательными веществами являются: кислота лимонная безводная, ароматизатор лимонный, ароматизатор апельсиновый, сахарин натрия, цикламат натрия, краситель оранжевый желтый (E110), поливинилпирролидон, фруктоза.

##### **Внешний вид препарата Гепе-Мерц и содержимое упаковки**

Гранулы от светло-оранжевого до оранжевого цвета.

По 5 г гранул в 1 пакетике.

По 30 пакетиков из бумажно-полиэтиленово-алюминиево-полиэтиленовой пленки вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

##### **Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

##### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Германия

Merz Pharma GmbH & Co.KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100, 60318, Frankfurt/Main

**За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения**

**на территории Республики Беларусь:**

Представительство акционерного общества «Arcino Pharma AG» (Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь

пр-т Победителей, 106-34, 220062, г. Минск, Республика Беларусь

тел. + 375 (17) 319 91 42

e-mail: Safety\_BY@arceralifesciences.com

##### **Листок-вкладыш пересмотрен**

ММ/ГГГГ

##### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <https://www.rceth.by>

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <https://www.rceth.by>