


1196 Б-2018



Листок-вкладыш – информация для потребителя
Этанол антисептический, 70 %, раствор для наружного применения,
Действующее вещество: этанол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Этанол антисептический, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Этанол антисептический.
3. Применение препарата Этанол антисептический.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Этанол антисептический.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЭТАНОЛ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Этанол антисептический, 70 %, раствор для наружного применения, содержит действующее вещество этанол.

Фармакотерапевтическая группа: Другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX08.

Лекарственный препарат применяют:

- для наружной терапии воспалительных заболеваний кожи инфекционной этиологии (начальные стадии фурункулов, панарициев);
- в качестве раздражающего средства (обтирания, компрессы);

- для антисептической обработки:
 - кожи в местах инъекций лекарственных препаратов в домашних условиях у лиц с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, онкологические заболевания и др.;
 - кожи рук медицинского персонала при доказанной аллергии на другие антисептические лекарственные препараты.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЭТАНОЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

Не применяйте препарат Этанол антисептический:

- если у Вас аллергия на этиловый спирт;
- если у Вас воспалительное заболевание кожи с нарушением целостности кожи.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Этанол антисептический проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Это особенно важно:

- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если у Вас нарушение функции печени и/или почек.

Наносить только на сухую чистую кожу.

Этанол легко воспламеняется. Не применять вблизи открытого огня! Не курить.

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников возгорания.

Дети и подростки

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.

Другие препараты и препарат Этанол антисептический

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в периоды беременности и грудного вскармливания не изучены.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат, используемый для наружного применения, не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. При

длительном применении в больших дозах возможно всасывание в системный кровоток, что может вызвать снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при управлении транспортными средствами, механизмами. Содержит этиловый спирт! При случайном приеме внутрь лекарственный препарат влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного препарата.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЭТАНОЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

- при наружном применении – 1 мл препарата на 1 см² кожи;
- при антисептической обработке кожи рук – 10 мл на одну обработку.

При антисептической обработке кожи, перед выполнением инъекций, равномерно нанести на обрабатываемый участок кожи стерильным тампоном, увлажненным препаратом.

Способ применения

Для наружного применения.

Если вы применили препарата Этанол антисептический больше, чем следовало

Явления передозировки при наружном применении препарата маловероятны. При появлении нежелательных реакций необходимо прекратить применение лекарственного препарата и обратиться к врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции;
- сонливость, головная боль (при вдыхании паров);
- раздражение, сухость кожи при частом нанесении препарата на влажную кожу рук.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, прекратите применение лекарственного препарата

и обратитесь к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29.

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЭТАНОЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Беречь от огня!

Не применяйте препарат по истечении срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Этанол антисептический содержит в качестве действующего вещества этанол (спирт этиловый) 70 %.

1 мл препарата содержит 1 мл спирта этилового 70 %.

Вспомогательные вещества отсутствуют.

Внешний вид препарата Этанол антисептический и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения.

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

По 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные крышкой; по 100 мл во флаконы с колпачком. Каждый флакон (100 мл) вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 100, 500, 1000 мл в бутылки полиэтиленовые с навинчиваемой крышкой. Каждую бутылку (100 мл) вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 1000 мл в бутылки полимерные с крышкой; по 1000 мл во флаконы с колпачком.

По 20 (500 мл) или 10 (1000 мл) бутылок/флаконов вместе с соответствующим количеством листов-вкладышей помещают в ящики из гофрированного картона или термоусадочную плёнку.

Условия отпуска:

Упаковки 1000 мл, 500 мл – для стационаров.

Упаковка 100 мл – по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», 223043, Минская обл., Минский р-н, с/с

Папернянский, д. Цнянка, ул. Армейская, д. 8, ком. 7

Тел.: +375 17 500-33-01, тел./факс: +375 17 500-33-46

E-mail: info@belaseptika.by

Листок-вкладыш пересмотрен:

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте: www.rceth.by.