

Листок-вкладыш — информация для пациента

Три-зидин М, 35 мг, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: триметазида дигидрохлорид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Три-зидин М, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Три-зидин М
3. Прием препарата Три-зидин М
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Три-зидин М
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Три-зидин М, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Три-зидин М содержит в качестве действующего вещества триметазидин (в виде триметазида дигидрохлорида).

Триметазидин относится к группе лекарств, применяемых для лечения заболеваний сердца.

Триметазидин улучшает обмен веществ в клетках сердца, и применяется у взрослых пациентов в сочетании с другими препаратами для лечения стабильной стенокардии (боли в груди, вызванной снижением поступления кислорода и питательных веществ в сердце).

Лекарственный препарат Три-зидин М показан к применению у взрослых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Три-зидин М

Не принимайте Три-зидин М, если:

- у Вас аллергия на триметазидин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- у Вас болезнь Паркинсона – заболевание мозга, приводящее к двигательным нарушениям (дрожание тела или конечностей, скованность движений, напряженность мышц тела, неспособность удерживать равновесие, избыточная двигательная активность ног во время сна или отдыха);
- у Вас тяжелое заболевание почек.

Если что-либо из выше перечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу или медицинской сестре до применения препарата Три-зидин М.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Три-зидин М проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Препарат Три-зидин М не предназначен для лечения приступа стенокардии (боли в груди, отдающей в плечо, руку, лопатку или нижнюю челюсть, возникающей при физической нагрузке или эмоциональном стрессе).

Препарат также не применяют для начального курса лечения нестабильной стенокардии (приступов боли в груди, возникающих часто и продолжительное время) или инфаркта миокарда (нарушения кровоснабжения сердца, приводящее к отмиранию клеток сердца).

При появлении приступа стенокардии сообщите об этом своему лечащему врачу. Вам может быть назначено обследование, а лечение возможно будет изменено.

Три-зидин М может вызвать или ухудшить симптомы болезни Паркинсона, такие как дрожание тела или конечностей, скованность движений, неспособность удерживать равновесие, шаркающая походка, избыточная двигательная активность ног во время сна или отдыха, особенно у пациентов пожилого возраста. При появлении таких симптомов необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу, который может пересмотреть лечение.

При применении препарата Три-зидин М возможны падения из-за понижения давления или потери равновесия (см. описание возможных нежелательных реакции в разделе 4).

Были получены сообщения о развитии серьезных кожных реакций, связанных с применением Три-зидин М, включая лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром) и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Следует прекратить прием препарата Три-зидин М и немедленно обратиться за медицинской помощью, если Вы заметили какие-либо симптомы серьезных кожных реакций, описанных в разделе 4.

Дети и подростки

Препарат Три-зидин М не предназначен для детей и подростков младше 18 лет.

Другие препараты и препарат Три-зидин М

Взаимодействия с другими препаратами отмечено не было.

Однако сообщите врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или возможно будете принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны, или кормите ребенка грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Беременность

Не рекомендуется принимать Три-зидин М во время беременности. Если во время приема

препарата Вы обнаружили, что беременны, сообщите об этом лечащему врачу, который примет решение о необходимости продолжения лечения.

Грудное вскармливание

Во время лечения препаратом Три-зидин М грудное вскармливание не рекомендуется из-за отсутствия данных о выделении лекарственного препарата в грудное молоко. Сообщите своему лечащему врачу, что Вы кормите грудью или планируете начать грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При приеме препарата Три-зидин М у Вас могут возникнуть головокружение и сонливость, что может повлиять на Вашу способность управлять механизмами.

3. Прием препарата Три-зидин М

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 1 таблетке два раза в сутки утром и вечером во время еды.

Особые группы пациентов

Дети и подростки младше 18 лет

Препарат Три-зидин М не предназначен для детей и подростков младше 18 лет.

Пациенты пожилого возраста

Если Вы старше 75 лет, Ваш врач может скорректировать рекомендуемую дозу.

Пациенты с нарушением функции почек

Если у Вас имеются нарушения функции почек, Ваш врач может скорректировать рекомендуемую дозу.

Путь и (или) способ введения

Для приема внутрь.

Таблетки препарата Три-зидин М следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды, во время еды.

Если Вы приняли препарата Три-зидин М больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Три-зидин М больше, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли принять препарат Три-зидин М

Если Вы забыли принять Три-зидин М, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата Три-зидин М

Ваш врач сообщит Вам, как долго необходимо продолжать лечение. Вам необходимо посоветоваться с врачом перед тем, как прекращать прием препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Три-зидин М может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Следует прекратить прием Три-зидин М и немедленно обратиться к врачу, если Вы заметили следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно:

- распространенная сыпь, высокая температура тела, повышение уровня ферментов печени, нарушения со стороны крови (эозинофилия), увеличение лимфатических узлов и поражение других органов (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами, известная как DRESS-синдром). См. также раздел 2;
- серьезная генерализованная красная кожная сыпь с волдырями.

Другие нежелательные реакции

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10)

- головокружение;
- головная боль;
- боли в животе;
- диарея;
- диспепсия (нарушения пищеварения);
- тошнота;
- рвота;
- сыпь на коже или слизистых оболочках;
- крапивница (аллергическая зудящая сыпь);
- чувство усталости.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100)

- необычные ощущения на коже, такие как покалывание или ощущение ползания мурашек (парестезия).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)

- ощущение учащенного сердцебиения;
- нарушение ритма сердца с преждевременным сердечным сокращением, которое может проявляться толчками или сильными ударами сердца, чувством замирания сердца;
- учащенное сердцебиение;
- снижение артериального давления при принятии вертикального положения тела, которое может сопровождаться головокружением, обмороком, падением;
- приливы крови к коже лица.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно)

- снижение количества лейкоцитов в крови;
- снижение количества тромбоцитов в крови с повышенным риском кровотечений;

- симптомы паркинсонизма (дрожание тела или конечностей, скованность движений, неспособность удерживать равновесие, шаркающая походка, избыточная двигательная активность ног во время сна или отдыха);
- нарушения сна (сонливость или бессонница);
- ощущение вращения окружающих предметов;
- запор;
- гепатит (воспалительное заболевание печени);
- тяжелая красная кожная сыпь с образованием пузырей;
- аллергический отек лица, губ, рта, языка или горла, что может вызвать затруднения глотания или дыхания.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, Минск, Товарищеский пер., 2а.

Телефон: +375 (17) 242-00-29.

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Телефон: +7 (7172) 235-135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: <http://www.ndda.kz>

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1.

Тел.: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул.3-я линия, 25

Телефон: +996 312 21 92 86; 0800 800 26 26

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт: <https://dlsmi.kg/>

5. Хранение препарата Три-зидин М

Хранить в оригинальной упаковке (блистер) для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию, уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Данные меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Три-зидин М содержит

Действующим веществом является: триметазидина дигидрохлорид.

Каждая таблетка с модифицированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой содержит 35 мг триметазидина дигидрохлорида.

Прочими (вспомогательными) веществами являются гипромеллоза 2208, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая;

состав оболочки пленочной розовой 1: поливиниловый спирт частично гидролизированный, титана диоксид E171, макрогол/ПЭГ, тальк, железа оксид желтый E172, железа оксид красный E172, магнетит/железа оксид черный E172.

Внешний вид препарата Три-зидин М и содержимое упаковки

Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой розового цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По шесть контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Республика Беларусь

СООО «Лекфарм»

223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301.

Телефон: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by.

Производитель

Республика Беларусь

СООО «Лекфарм»

223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, 2А/4.

Телефон: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by.

Этот лекарственный препарат зарегистрирован в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под следующими торговыми наименованиями:

Республика Беларусь: Три-зидин М

Российская Федерация: Тримитард МВ

Республика Казахстан: Три-зидин М

Кыргызская Республика: Три-зидин М

За любой информацией о препарате, а также в случаях появления претензий, возникновения нежелательных реакций следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

СООО «Лекфарм»

223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301

Телефон: (01774)-53801,

Электронная почта: office@lekpharm.by, sideeff@lekpharm.by

Республика Казахстан

Представительство СООО «Лекфарм» в Республике Казахстан,

050000, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 19,

корпус 2Б, офис 202 (БЦ «Нұрлы Тау»)

Телефон: 8(727)-3110454, телефон 24/7: +77013285139

Электронная почта: sideeff_kz@lekpharm.by

Российская Федерация

Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр Фармаконадзора»

143026, г. Москва, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 103, ком. 13

Телефон: 8 800 777-86-04

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Кыргызская Республика

ООО «ДасМед»

720043, г. Бишкек, ул. Садыгалиева 1в

Телефон: +996 556 699 466

Электронная почта: pv@dasmed.kg

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <http://eec.eaeunion.org/>.