


НД РБ  
21105-2020



**Инструкция по медицинскому применению  
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**

**ПАНТЕСЕПТ,  
100 мг+16 мг, суппозитории вагинальные  
Действующие вещества: декспантенол+хлоргексидин**

Перед применением данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша:**

1. Что из себя представляет препарат Пантесепт и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Пантесепт.
3. Применение препарата Пантесепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Пантесепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ПАНТЕСЕПТ  
И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Лекарственный препарат Пантесепт содержит декспантенол и хлоргексидина биглюконат.

*Фармакотерапевтическая группа:* Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Прочие противомикробные и антисептические средства.

Хлоргексидин обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (не влияет на кислотоустойчивые формы последних): *Trichomonas pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, простейших (*Trichomonas vaginalis*), микробных спор, вирусов, грибов; слабо влияет на некоторые виды протей и псевдомонад. Сохраняет активность (несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Декспантенол является провитамином В<sub>5</sub>. При местном применении способствует регенерации кожи и слизистых оболочек.

**Показания к применению:**

- Острые и хронические вагиниты.
- Бактериальный вагиноз.
- Неспецифические эндо/экзоцервициты (в том числе в сочетании с истинной эрозией шейки

матки).

– Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии: перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, родоразрешением, медицинским прерыванием беременности, внутриматочными обследованиями (в том числе гистероскопии, гистеросальпингографии), перед установкой внутриматочного контрацептива.

– Для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

*Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.*

## 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕПТ

### **Не применяйте препарат Пантесепт**

– если у вас аллергия на декспантенол и/или хлоргексидин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

До и после применения препарата следует вымыть руки.

### **Другие препараты и препарат Пантесепт**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-то другие препараты.

Не следует применять Пантесепт одновременно с другими антисептиками, вводимыми интравагинально.

Препарат Пантесепт не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Специальных клинических исследований по применению препарата Пантесепт у беременных женщин и в период грудного вскармливания не проводилось. Исследования на лабораторных животных не продемонстрировали вредного воздействия декспантенола и хлоргексидина на течение беременности, развитие эмбриона, роды или послеродовый период. Применение при беременности и в период лактации допустимо в случае, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕПТ

Лекарственный препарат Пантесепт отпускается без рецепта врача.

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

2110Б-2020



Препарат Пантесепт вводят по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.

#### **Применение у детей и подростков**

Данные о применении препарата у детей отсутствуют.

#### **Путь и способ введения**

Для интравагинального применения.

Перед применением препарата рекомендуется провести гигиенические процедуры и тщательно вымыть руки. Суппозиторий следует извлечь из контурной упаковки и ввести глубоко во влагалище.

#### **Продолжительность терапии**

Курс лечения 7-10 дней.

При необходимости курс лечения можно продлить до 20 дней.

#### **Если Вы применили препарата Пантесепт больше, чем следовало**

Применяйте Пантесепт в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Не превышайте рекомендованные дозы. Продолжительность терапии определяется лечащим врачом.

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

#### **Если Вы забыли применить Пантесепт**

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Пантесепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:**

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Раздражение слизистой оболочки влагалища (жжение, зуд),
- Сукровичные выделения из влагалища;

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- Аллергические реакции: сыпь, зуд, крапивница;

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Тяжелые аллергические реакции и анафилаксия.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕПТ**

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности препарата 2 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 15 °С.

Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Пантесепт содержит:

*Действующими веществами* препарата являются декспантенол и хлоргексидина биглюконат.

Каждый суппозиторий содержит:

Действующие вещества: декспантенол - 100 мг, хлоргексидина биглюконат - 16 мг в пересчете на 100 % вещество.

Вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400.

### **Внешний вид препарата Пантесепт и содержимое упаковки:**

Пантесепт представляет собой суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из полимерных материалов (ПВХ/ПЭ).

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,

e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

**Данный листок-вкладыш пересмотрен:**

08/2025

