

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трофикол Скар

ФОРМА ВЫПУСКА

Средство для применения в дерматологии: крем от рубцов и шрамов в тубе массой 30 г.

СОСТАВ

Вода очищенная, сухой экстракт опунции, масляный экстракт опунции, кунжутное масло, арахисовое масло, карбомер, макроглицерина гидроксистеарат, диэтиленгликоль моноэтиловый эфир, альфа-токоферилацетат, изопропилмирилат, декспантенол, феноксиэтанол, бета-ситостерол, триэтаноламин.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Крем Трофикол Скар, благодаря входящей в его состав комбинации уникальных компонентов, обладает следующими свойствами: регенераторными, противовоспалительными, антиоксидантными, противомикробными. Снимает симптомы воспаления, улучшает процессы регенерации тканей, устраняет зуд и боль, способствует увлажнению и уменьшает раздражение.

Экстракт опунции уменьшает образование гипертрофических рубцов за счет ингибирования коллагена типа I и увеличения коллагена типа III; усиливает регенераторные свойства кожи; способствует ремоделированию рубца, его разглаживанию путем усиления микроциркуляции в рубцовой ткани; оказывает защитное действие против УФ-облучения; обладает противомикробными свойствами; увлажняет кожу.

Декспантенол улучшает заживление благодаря активации фибробластов; уменьшает воспаление; снижает зуд и боль, возникающие в месте рубца; уменьшает раздражение кожи; увлажняет.

Бета-ситостерол ускоряет заживление благодаря уменьшению трансэпидермальной потери воды и увлажнению кожи; обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами; устраняет зуд, способствует биосинтезу гиалуроновой кислоты.

Кунжутное масло содержит поли- и мононенасыщенные жирные кислоты, фитостерины. Они способствуют заживлению и смягчению кожи. Также масла создают окклюзионный эффект и уменьшают трансдермальную потерю жидкости кожей.

Витамин E участвует в процессах регенерации кожи, способствует заживлению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Крем для лечения, предупреждения образования и улучшения внешнего вида рубцов, шрамов и растяжек:

- после косметических процедур, таких как микронидлинг, дермабразия, пилинг;
- посттравматические рубцы и шрамы (ожоги, колотые и резаные раны и др.);
- послеоперационные рубцы и шрамы (кесарево сечение, пластическая хирургия и другие операционные вмешательства);
- гипертрофические рубцы и шрамы (после ожогов и др.);
- келоидные рубцы;
- рубцы и шрамы после ветряной оспы и опоясывающего лишая;
- рубцы и шрамы после лазерной коррекции;
- рубцы и шрамы после акне;
- атрофические, впалые рубцы;
- растяжки;
- эрозии кожи вследствие воздействия химических веществ, мороза или сухости.



Копия верна
Специалист
по регистрации и сертификации
Ирина Валерьевна
Меринялова

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется только на чистой коже.

• Для профилактики патологического рубцевания применение крема Трофикол Скар оптимально начинать в течение 20-ти дней после эпителизации (заживления) раны или снятия послеоперационных швов.

Крем необходимо наносить на чистую поверхность кожи тонким слоем, легко массируя кончиками пальцев в течение 5-10 минут. Применять 2-4 раза в день. Для усиления лечебного эффекта возможно наносить крем при помощи ультразвука. Минимальный курс лечения составляет 30 дней.

• При обширных формирующихся или уже сформировавшихся рубцах крем необходимо наносить прижимающими движениями в течение 10-15 минут. В случае выраженной гипертрофии оптимально дополнительное использование эластичного бинта или компрессионного белья. Применять 1-2 раза в день. Возможно накладывать повязку с кремом на область, где имеются рубцовые деформации, которую необходимо менять ежедневно. При обширных рубцах курс лечения составляет от 3 месяцев до года и зависит от индивидуальных особенностей и типа рубцов. Как правило, положительный эффект наблюдается уже в течение 1-го месяца регулярного применения крема.

• Для устранения гиперпигментации наносить небольшое количество крема, массируя кончиками пальцев в течение 5-10 минут до полного впитывания. Применять 1-2 раза в день.

• При шрамах после угревой сыпи (постакне) применять 3-4 раза в день, массируя легкими движениями в течении 2-5 минут.

• Для уменьшения зуда массируйте проблемный участок в течении 5-10 минут и зуд начнет ослабевать.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать при аллергии на любой из компонентов. Возможны реакции гиперчувствительности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза и открытые раны.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не были выявлены.

УПАКОВКА

Алюминиевая туба с инструкцией по применению в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.



Копия верна
Специалист
по регистрации и сертификации
Л.М. Шибанова

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг.
Слобода, комната 55.
Тел./факс: +375(17) 555-52-76
e-mail: info@lphc.by
сайт: www.lphc.by



Копия верна
Специалист
по регистрации и сертификации
Крегол Вячорка
Миниловна